OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR
(Prix du présent fascicule : 3 fr. 50)

12,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY,

VINGT-DEUXIÈME FASCICULE

(20 février 1917)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1917

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

INTRODUCTION

Ce fascicule contient des descriptions diverses d'insectes faisant, au moins, partie de ma collection. Quelques espèces indo-chinoises m'ont été procurées par M. Vitalis de Salvaza, infatigable chercheur dont il a déjà été parlé précédemment ; certaines de celles-ci (non uniques) figurent également dans la collection de ce naturaliste et, dans ce cas, mention spéciale en est faite ! Une quinzaine d'espèces nouvelles sont originaires de Madagascar.

Je répète, pour ne pas avoir à le mentionner à chaque description, que tous les types uniques procurés par M. Vitalis se trouvent dans la collection Pic, ainsi que les autres d'origines variées.

DESCRIPTIONS ABRÉGÉES DIVERSES

Monomma major n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, sparse et brevissime pilosus, niger. Thorace transverso, angulis anticis prominulis, sat fortiter et sparse punctato ; elytris elongatis, minute striatis, distincte lineato-punctatis, intervallis minute punctatis ; tarsis satis elongatis. Long. 8 mill. Côte d'Ivoire. — Voisin de *M. limbaticolle* Pic, plus grand avec une coloration plus foncée sur le prothorax dont, en outre, les angles antérieurs sont plus saillants.

Monomma subovatum n. sp. Subovatus, parum nitidus, sparse et parum distincte pilosus, nigro-piceus, thorace antice breve et lateraliter late, epipleuris, infra corpore pedibusque pro majore parte rufescentibus. Thorace transverso, angulis anticis satis prominulis, sat fortiter et sparse punctato ; elytris subovatis, postice attenuatis, minute striatis, distincte lineato-punctatis, intervallis minutissime punctatis ; tarsis satis elongatis. Long. 4 mill. Abyssinie. — Ressemble à *M. subæneum* Pic, mais coloration différente et élytres à stries distinctes quoique faibles.

Monomma laosense n. sp. Subovatus, postice attenuatus, nitidus, glaber, niger, elytris submetallicis, capite antice, thorace pro parte lateraliter, epipleuris, antennis pedibusque pro parte rufescentibus. Long. 4-5 mill. Laos. — Par sa structure très voisin de *M. tonkineum* Pic, mais élytres un peu plus courts, stries-ponctuées sur les élytres moins larges, épipleures et pattes plus claires.

Hyporhagus guyanensis n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, sparse pilosus, nitidus, niger, thorace antice et lateraliter rufo tincto. Thorace parum transverso, antice attenuato, mediocre et sparse punctato ; elytris sub-

elongatis, multi lineato-punctatis, fere instriatis. Long. 4 mill. Guyane française : Maroni. — Diffère de *H. elongatus* Pic par les élytres moins parallèles et moins longs, le prothorax moins fortement ponctué, etc.

Cyparium semirufum n. sp. Subovatus, nitidus, nigro-piceus, capite antice, antennis ad basin, pedibus pro parte, pygidio pro parte elytrisque testaceis aut rufescentibus. Thorace disperse et irregulariter punctato ; elytris distincte lineato-punctatis, ab basin interne transverse punctatis, ad suturam minute striatis. Long. 4 mill. Tonkin. — A placer près de *C. submetallicum* Reitt. dont il se distingue, à première vue, par la coloration.

Scaphidium rufipenne n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, antennis apice, femoribus apice tibiisque pro parte nigris. Thorace elongato, sparse et minute punctato, ad basin transverse lineato-punctato ; elytris elongatis, ad suturam impressis, in disco reducte bilineato punctatis, ab basin interne transverse punctatis. Long. 7 mill. Madagascar : Tananarive. — Plus allongé que *S. interruptum* Frm., avec la coloration bien différente.

Ptilodactyla Rouyeri n. sp. Angustatus, postice attenuatus, nitidus, griseo pubescens, niger, antennis brunneis, ab basin testaceis, pedibus testaceis. Long. 5 mill. Java (Rouyer). — Plus grêle que *angustatipennis* Pic avec le dessous plus foncé et le prothorax un peu moins court.

Ptilodactyla dæmoniformis n. sp. Oblongo-elongatus, postice attenuatus, subdepressus, nitidus, griseo pubescens, rufo-testaceus, oculis nigris. Thorace sat sparse punctato-pupillato, ad basin distincte impresso ; elytris ad basin impressis, ad suturam et postice substriatis. Long. 8 mill. Ile Banguey. — Très distinct du précédent par sa forme rappelant celle de *Dæmon* Cast. et sa coloration générale claire.

Ptilodactyla madurensis n. sp. Oblongo-elonga-

tus, nitidus, parum punctatus, rufescens, capite, antennis thoraceque nigro-piceis. Thorace sat sparse punctato-pupillato, antice testaceo marginato, postice depresso ; elytris substriatis, intervallis mediocre punctatis. Long. 5 mill. Indes : Madura. — Sans doute voisin de *P. picea* Mots., s'en distingue au moins par la coloration différente.

Ptilodactyla Lajoyei n. sp. Oblongus, nitidus, griseo pubescens, niger, capite antice, antennis pedibusque testaceis. Thorace breve, sat dense punctato-pupillato ; elytris satis brevibus, mediocre striato-punctatis. Long. 4 mill. Saïgon (ex Lajoye). — Plus court que le précédent, plus foncé, avec le prothorax à ponctuation plus dense et sans dépression bien marquée à la base.

Ptilodactyla robusta n. sp. Oblongus, latus, nitidus, griseo pubescens, niger, oculis, antennis, tibiis tarsisque rufis. Long. 5 mill. Sumatra. — En outre de la coloration moins pâle des membres, se distingue du précédent par la forme plus robuste et la pubescence plus distincte.

Ptilodactyla medanensis n. sp. Oblongo-subelongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, labro, antennis pedibusque rufescentibus. Thorace breve, sat dense punctato-pupillato ; elytris satis elongatis, fortiter striatis. Long. 6 mill. Sumatra : Medan. — Plus grand que le précédent et très distinct par les stries très marquées des élytres.

Ptilodactyla granulata n. sp. Oblongus, sat latus, nitidus, griseo pubescens, niger aut nigro-piceus, tarsis rufescentibus. Thorace sparse punctato-pupillato, ad basin distincte depresso ; elytris satis brevibus, striato-punctatis, intervallis distincte granulatis. Long. 3-3, 5 mill. Bornéo. — Espèce caractérisée par la sculpture élytrale et les antennes foncées.

Lucidina Vitalisi n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, parum nitidus, niger, abdomine apice thoraceque pro parte testaceis. Antennis longis, depressis ; thorace

parum transverso, antice subsinuato et attenuato, testaceo, in disco nigro maculato, lateraliter brunneo cincto ; scutello subtriangulare ; elytris obsolete costulatis, dense rugulosis. Long, 12-13 mill. Tonkin : Chapa (coll. Pic et Vitalis). — Voisin de *L. accensa* Gorh., plus allongé, prothorax de forme différente, antennes moins atténuées à l'extrémité, etc.

Lucidina tonkinea n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, parum nitidus, nigrescens, thorace pallido, in disco picescente. Antennis compressis ; thorace parum transverso, antice regulariter attenuato ; scutello breve ; elytris obsolete costatis et rugulosis. Long. 9-10 mill. Tonkin : Ho-Chan. — Très distinct du précédent par la forme non brusquement rétrécie du prothorax en avant, la coloration élytrale moins foncée, etc.

Lucidina roseonotata n. sp. Elongatus antice et postice attenuatus, subopacus, niger, infra corpore pro parte abdomineque roseis ; thorace testaceo, postice in disco roseo notato, piceo cincto. Antennis longis, depressis, satis latis, apice attenuatis ; thorace parum tranverso, antice attenuato, in disco sulcato ; scutello subtriangulare ; elytris rugulosis, pro parte et parum distincte costulatis. Long. 11 mill. Formose : Fainan. — Très distinct de *L. accensa* Gorh. par la coloration rosée du prothorax étendue sur le milieu de cet organe.

Lucidina malaccana n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, subopacus, nigrescens, thorace abdomineque roseis, pedibus pro parte picescentibus. Antennis parum longis, valde depressis ; thorace parum transverso, antice regulariter attenuato, pro parte brunneo cincto ; scutello elongato, apice truncato ; elytris rugulosis, subimpressis et carinatis. Long. 7 mill. Malacca : Perak. — Plus allongé que le précédent avec le prothorax moins large.

Lucidina sumatrensis n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, subopacus, nigrescens, infra corpore majore parte roseo, thorace piceo, in disco roseo bimaculato

pedibus pro parte picescentibus. Antennis satis brevibus, depressis, apice indistincte attenuatis ; thorace transverso, antice fortiter attenuato, mediocre carinato ; scutello elongato, apice truncato ; elytris rugulosis, costatis. Long. 8 mill. Sumatra. — Diffère du précédent par la structure des antennes, le prothorax brusquement rétréci en avant et transversal, etc.

Dilychnia costatipennis n. sp. Angustatus, antice et postice attenuatus, fere opacus, griseo pubescens, niger, capite, thorace pedibusque pro parte testaceis. Antennis corporis longitudine fere æqualibus, parum latis, sed depressis, apice attenuatis ; thorace parum elongato, antice attenuato, testaceo, rubro tincto, antice picescente ; scutello apice truncato ; elytris distincte et abbreviato tricostatis ; pedibus pro parte testaceis. Long. 8 mill. Indo-Chine : Bor Nabor (ex Vitalis). — Espèce très distincte par ses élytres ornés chacun de 3 côtes raccourcies ainsi que par sa coloration.

Pyrocœlia incostata n. sp. Latus, oblongo-ovatus, subopacus, rufo-testaceus, capite, antennis, palpis, elytris, femorum apice, tibiis tarsisque nigris. Antennis depressis, apice attenuatis ; thorace transverso, antice arcuato, concolore, angulis posticis subrotundatis ; scutello elongato, apice subarcuato ; elytris subovatis, antice lateraliter explanatis et impressis, rugulosis, incostatis ; pygidio apice bisinuato. Long. 20 mill. Tonkin : Laokay (ex Vitalis). — Voisin de *P. amplissima* E. Ol., mais élytres sans côtes et prothorax de coloration uniforme.

Cantharis monstrosipennis n. sp. Satis brevis, nitidus, pallido-testaceus, articulis 2 ultimis antennarum, tibiis apice tarsisque nigris ; elytris cyaneo-metallicis. Antennis brevibus ; thorace subquadrato ; elytris lateraliter sinuatis, apice truncatis, supra pro parte impressis, ad medium fascia subviolacea, obliqua et punctata, ornatis. Long. 15 mill. Tonkin : Chapa (ex Vitalis). — Espèce très

distincte par la particulière sculpture de ses élytres ; peut se placer près de *C. chalybeipennis* Gorh.

Cantharis pallidocincticollis n. sp. Elongatus, postice strangulatus, capite, thorace in disco (illo pallido cincto), pectore pedibusque viridi-metallicis, antennis nigris, ad basin infra rufo tinctis ; elytris viridescentibus, densissime rugulosis, opacis ; abdomine testaceo, nigro maculato. Long. 18 mill. Thibet. — Très voisin de *C. Bieti* Gorh. élytres un peu plus longs, autrement colorés, abdomen non entièrement foncé, etc.

Cantharis quadratithorax n. sp. Parum elongatus, nitidus, distincte pubescens, testaceus, antennis pedibusque nigris. Capite lato, oculis prominulis ; antennis longissimis ; thorace quadrato, antice subarcuato, in disco inæquale; elytris satis latis et elongatis, densissime ruguloso-punctatis ; pedibus gracilibus. Long. 11 mill. Tonkin : Chapa (ex Vitalis). — Espèce très distincte par la forme de son prothorax jointe à sa tête courte aux yeux très saillants ; peut se placer provisoirement près de *C. Guerryi Pic.*

Cantharis chapaensis n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, violaceo-metallicus, elytris viridi-metallicis, capite antice, antennis, thorace lateraliter, pectore femoribusque ad basin pallido-testaceis ; abdomine pro majore parte piceo. Long. 22 mill. Tonkin : Chapa (ex Vitalis). — Voisin de *C. stigmatius* Frm., mais base des cuisses testacée pâle, macule prothoracique foncée bilobée, etc.

Lycocerus distinctecostatus n. sp. Angustatus, parum nitidus, niger, thorace elytrisque purpureo pubescentibus. Thorace parum elongato, lateraliter fere recte, in disco sulcato et impresso ; elytris angustatis, subparallelis, in disco singulo costatis. Long. 10 mill. Tonkin : Chapa (ex Vitalis). — Voisin de *lineaticeps* Pic, tête sans bandes rousses au vertex, prothorax moins long et élytres à côtes un peu plus fortes.

Pseudoleptaleus piligibbosus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, piceus, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis. Capite lato, fortiter et sparse punctato ; thorace parum elongato, antice elevato, postice minute gibboso ; elytris ad basin distincte depressis, luteo et albido fasciatis et distincte tuberculatis (tuberculis pilis nigris ornatis) ; pedibus satis validis. Long. 3 mill. Guyane française. — Voisin de *P. bituberculatus* Champ. et distinct, à première vue, par les gibbosités basales des élytres ornées de longs poils dressés.

Pseudoleptaleus cubanensis n. sp. Oblongo-elongatus, pro parte nitidus, piceus, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis. Capite thoraceque strigosis, illo ad basin minute bituberculato ; elytris ad basin mediocre depressis, albido fasciatis, parum distincte gibbosis. Long. 3 mill. Cuba. — Très voisin de *P. bicallosus* Pic, mais prothorax à structure un peu différente et élytres paraissant moins courts.

Leptaleus prolongatipygus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite antice, antennis, thorace pedibusque testaceis, elytris ad basin et post medium externe testaceo maculatis. Capite lato, parum punctato ; thorace antice dilatato-rotundato, parum punctato ; elytris subelongatis, ad basin subdepressis, sparse punctatis ; pygidio valde prominulo ; pedibus validis. — Long. 4 mill. Madagascar : Tananarive. — A placer près de *L. truncatulus* Frm.

Anthicus longiterminalis n. sp. Oblongus, nitidus, testaceis, abdomine brunnescente, elytris ad suturam et post medium piceo maculatis. Articulo ultimo antennarum elongato, maximo ; capite postice attenuato et arcuato, sparse punctato ; thorace antice dilatato-rotundato, ad basin fere recto, sat sparse punctato ; femoribus posticis validis, subarcuatis. Long. 3 mill. Madagascar : Androy. — Voisin de *A. jejunus* Pic, dernier article des antennes un peu moins long, élytres plus larges et maculés.

Anthicus subnotatipennis n. sp. Oblongus ♀, aut parum elongatus ♂, nitidus, testaceus, antennis apice brunnescentibus, articulo ultimo elongato, elytris postice ad suturam piceo maculatis (aliquot immaculatis : var. *subinotatipennis*) Long. 3 mill. Madagascar. — Diffère du précédent par le dernier article des antennes moins long.

Anthicus majunganus n. sp. Oblongus, satis nitidus, testaceus, elytris ad suturam postice vage fusco maculatis. Articulo ultimo antennarum satis breve et lato ; capite postice subarcuato, fortiter sat sparse punctato ; thorace fortiter et dense punctato. Long. 3 mill. Madagascar : Majunga. — Voisin du précédent, en diffère par le dernier article des antennes plus court et le prothorax à ponctuation dense.

Anthicus longipygus n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, testaceus, elytris postice ad suturam piceo maculatis. Capite postice arcuato, fortiter et sparse punctato ; articulo ultimo antennarum parum elongato ; thorace antice dilatato-rotundato, postice fere recto, fortiter et sparse punctato ; elytris plus minusve elongatis, ad suturam striatis ; pygidio longo, prominulo ; pedibus validis. Long. 3,5 mill. Madagascar : Tananarive. — Diffère, à première vue, des précédentes espèces par la forme de la tête non rétrécie derrière les yeux.

Anthicus longipygus var. nov. breviterminalis. Antennis apice nigris, articulo ultimo breve et lato ; thorace antice subangulato-rotundato ; elytris oblongiusculis. Un seul exemplaire de Mahatsinjo.

Anthicus circumflexus n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, antennis apice brunnescentibus, elytris post medium macula picea sinuata, postice acuminata, ornatis, ad basin et apice breve piceo maculatis. Capite postice attenuato, obconico, minute et sparse punctato ; articulo ultimo antennarum satis elongato ; thorace antice dilatato-subrotundato, ad basin recto, sat dense punctato ; elytris

satis latis, antice et postice attenuatis. Long. 3 mill. Madagascar. — Diffère nettement de *A. soarezicus* Pic, dont il rappelle la forme, par les dessins des élytres.

Anthicus amplipennis v. nov. breviorithorax. Rufescens, antennis apice pedibusque pallidioribus. Thorace satis breve, sat dense punctato ; elytris latis, satis brevibus, ad basin et fortiter impressis, irregulariter punctatis. Brésil.

Anthicus (Acanthinus) pallidioripes n. sp. Oblongus, nitidus, rufescens, antennis (his apice pallidioribus) thoraceque piceis, pedibus luteo-testaceis, tibiis ad basin rufescentibus. Capite postice arcuato, fere impunctato ; antennis gracilibus ; thorace breve, antice dilatato et subdenticulato, fortiter et dense punctato ; elytris latis, satis brevibus, apice attenuatis, ab basin valde depressis, irregulariter et sparse punctatis ; pedibus validis. Long. 3 mill. Brésil : Blumeneau. — Voisin de *A. amplipennis* Pic, mais prothorax plus foncé et ponctuation différente.

Anthicus (Aulacoderus) sulcatulus n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, infra corpore nigro, elytris ab basin in disco nigro notatis, sutura nigra. Capite postice arcuato ; antennis testaceis, articulo ultimo elongato ; thorace satis breve, antice modice dilatato, ad basin transverse minute sulcato, sat dense punctato ; elytris subovatis, sparse punctatis ; pedibus gracilibus. Long. 3 mill. Afrique Orientale anglaise. — Voisin de *A. Maynei* Pic, mais sillon du prothorax moins marqué et plus rapproché de la base, coloration élytrale différente, etc.

Incollogenius humeralis n. sp. Elongatus, parum nitidus, dense punctatus, niger, elytris ad humeros breve testaceo maculatis. Long. 9 mill. Madagascar : Tananarive. — Diffère de *I. testaceipennis* Pic, en outre de la coloration, par les antennes plus courtes, le prothorax marqué de 2 petites fossettes sur le disque et les élytres plus densément ponctués.

Nemostira elongatior n. sp. Angustatus, nitidus, pilosus, testaceus, pro parte rufescens, antennis, articulo primo excepto, abdomine, tibiis tarsisque nigris. Capite lato, oculis distantibus ; antennis satis elongatis ; thorace longe, lateraliter sinuato, fortiter et irregulariter punctato ; elytris longissimis, angustatis, apice attenuatis, indistincte striatis, irregulariter punctatis. Long. 18 mill. Tonkin : Chapa (ex Vitalis). — Voisin de *N. tonkinea* Pic, mais plus allongé, avant-corps de coloration plus claire et élytres de sculpture différente.

Nemostira laosensis n. sp. Parum elongatus, nitidus, longe pilosus, niger, antennis ad basin, capite, thorace scutelloque rufis. Capite breve, oculis distantibus ; antennis brevibus ; thorace breve et lato, parum distincte punctato ; elytris satis latis, apice attenuatis, striato-punctatis, intervallis in disco latis ; pedibus nigris. Long. 8 mill., Laos : Vientiane (ex Vitalis) — Peut se placer près de *N. mentaveiensis* Pic, tête plus large, prothorax moins distinctement ponctué, elytres et pattes plus foncés.

Nemostira Vitalisi n. sp. Parum elongatus, subnitidus, fere glaber, niger. Capite lato, in vertice foveato ; antennis elongatis ; thorace breve et lato, fere impunctato, ad basin transverse lineato punctato ; elytris latis, apice parum attenuatis, striato-punctatis. Long. 9-10 mill. Tonkin : Chapa (coll. Pic et Vitalis) — Diffère du précédent par la tête fovéolée, les antennes plus grêles, etc.

Nemostira Vitalisi v. nov. rufithorax. Niger, thorace rufo. Tonkin : Chapa (ex Vitalis).

Nemostira atrosuturalis n. sp. Elongatus, nitidus, sparse pubescens, testaceus, sutura nigra, femoribus ad apicem brunnescentibus. Capite longissimo, oculis nigris, distantibus ; antennis elongatis ; thorace parum elongato, minutissime punctato ; elytris satis latis, apice valde attenuatis, mediocre striato-punctatis. Long. 10 mill. Madagascar : Tananarive — Voisin de *N. rostrifera* Frm.,

en diffère par les élytres à suture foncée, les cuisses bicolores, etc. Ressemble, d'autre part, à *externa* Borch. (de la Montagne d'Ambre) qui est roussâtre avec le dessous du corps un peu rembruni, tandis que les élytres sont d'un brun de poix bordés de roux très largement sur la suture et en arrière, tandis que la tête est bien plus longue. La diagnose latine de cette dernière est : Rufescens, elytris in disco antice late, postice minute, brunneo-pico notatis.

Nemostira tananarivana n. sp. Elongatus, nitidus, fere glaber, testaceus, capite, scutello et articulo ultimo antennarum nigris, infra corpore pro parte nigro, pro parte rufescente. Capite satis breve et lato ; antennis brevibus ; thorace satis breve, minutissime punctato ; elytris satis latis, apice minute attenuatis, médiocre striato-punctatis. Long. 9 mill. Tananarive. — Plus parallèle que le précédent avec la tête plus courte et foncée. A placer près de *N. apicicornis* Frm.

Nemostira rufa var. nov. abdominalis. Testaceus, capite, antennis abdomineque apice picescentibus ; pedibus nigro-piceis, femoribus ad basin testaceis. Congo portugais. — Diffère de *N. rufa* Borch. par la coloration différente de plusieurs parties du corps.

Nemostira Mocquerysi n. sp. Parum elongatus, nitidus, fere glaber, testaceus, antennis nigris, ad basin rufis, oculis nigris, femoribus ad apicem aut tarsis rufescentibus. Tête courte et large ; antennes assez larges ; prothorax court et large, finement et éparsément ponctué ; élytres assez larges, un peu dilatés en dessous du milieu et atténués à l'extrémité assez fortement strié-ponctués. Long. 9 mill. Gabon (Mocquerys) — Très voisin de *N. rufa* Borch., avant-corps moins ponctué et coloration des pattes et du dessous différente.

Nemostira gabonica n. sp. Parum elongatus, nitidus, fere glaber, testaceus (antennis fractis), oculis nigris, femoribus ad apicem aut tarsis rufescentibus. Tête assez

petite ; prothorax court et large, fortement résserré près des angles postérieurs qui sont très saillants ; élytres un peu élargis en dessous du milieu et atténués à l'extrémité, assez fortement strié-ponctués. Long. 9 mill. Gabon. — Diffère, à première vue, du précédent par le prothorax plus resserré près de la base et plus nettement ponctué, la tête nettement étranglée derrière les yeux.

Nemostira benitensis n. sp. Satis elongatus, nitidus, fere glaber, testaceus, antennis pro majore parte, oculis, pedibus pro parte et abdomine apice piceis. Capite postice transverse sulcato, oculis magnis ; antennis satis brevibus ; thorace satis breve, sparse punctato, Long. 10 mill. Gabon : Benito — Très voisin du précédent, mais tête à depression antérieure moins arquée, yeux plus gros et plus rapprochés, etc.

Nemostira semiobscura n. sp. Oblongo-elongatus, irregulariter punctatus, nitidus, distincte griseo hirsutus, rufescens, capite, thorace antennisque pro majore parte nigris. Long. 12 mill. ? Sumatra. — Très voisin de *N. villosa* Borch., mais ponctuation du prothorax plus fine et écartée, tête plus large derrière les yeux, enfin coloration différente.

Nemostira plicatipennis n. sp. Oblongo-elongatus, irregulariter punctatus, nitidus, distincte pubescens, rufescens, antennis apice et infra corpore pro parte piceis ; elytris striato-punctatis, intervallis pro parte plicatis. Long. 11 mill. Bornéo : Brunei. — Voisin de *N. villosa* Borch. et distinct, à première vue, par la sculpture élytrale.

Nemostira Rouyeri n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, griseo hirsutus, niger, antennis ab basin, capite, thorace pedibusque pro parte testaceis. Capite satis elongato, postice subgibboso et foveato ; antennis satis elongatis ; thorace breve, subalutaceo et mediocre punctato ; elytris subparallelis, apice attenuatis, crenato-striatis. Long. 7 mill. Sumatra (Rouyer). — A placer près de *N. annulipes* =

subannulipes in litt. (1) dont il diffère, à première vue, par la coloration plus foncée des élytres, etc.

Nemostira insularis n. sp. Elongatus, nitidus, fere glaber, testaceus, antennis piceis, ad basin testaceis, pedibus pro parte rufescentibus. — Tête peu longue, impressionnée en arrière ; antennes longues ; prothorax pas très long, à ponctuation forte et écartée ; élytres subparallèles, atténués postérieurement, fortement strié-ponctués. Long. 7 mill. Ile Banguey. — Voisin de *N. pallidior* Pic, plus allongé, ponctuation du prothorax plus forte, etc.

Falsonemostira n. gen. (2) Antennis subfiliformibus, articulo ultimo elongato, arcuato ; capite breve et lato, post oculos non attenuato ; oculis mediocris, distantibus ; thorace breve, postice fortiter marginato et transverse sulcato ; elytris elongatis, crenulato-punctatis, postice sulcatis, intervallis valde angustatis ; femoribus satis brevibus, tibiis ad basin subarcuatis. — Intermédiaire entre *Borchmania* Pic et *Nemostira* Fairm., à placer près de *Rouyerus* Pic.

Microtonus asiaticus n. sp. Angustatus, postice attenuatus, luteo pubescens, dense punctatus, subopacus, testaceus, capite thoraceque rufescentibus, oculis nigris. Antennis satis elongatis ; thorace breve ; elytris longissimis. Long. 4 mill. Indes : Madura. — Peut se placer près de *M. gracilis* Chp., dont il se distingue par la forme plus allongée et la coloration plus claire.

Synchroa malaccana n. sp. Angustatus, postice attenuatus, nitidus, sparse pubescens et sparse punctatus, nigro-piceus. Oculis valde prominulis ; thorace postice impresso et bifoveolato ; elytris instriatis, ad suturam postice

(1) In *Mélanges Exotico Ent.* 17, 1916, p. 12, le nom de *subannulipes* a été, par erreur, copié *annulipes* et l'impression s'en est suivie sans que je m'en aperçoive. Le nom de *annulipes* me paraît devoir cependant, par simplification, rester, car la première espèce décrite sous ce nom en 1912, ne serait pas en réalité un *Nemostira* Fairm.

(2) Pour l'ancien *Nemostira annulipes* Pic (*Ech.* 1912, p. 39).

impressis. Long. 7-8 mill. Malacca : Perak. — Voisin de *S. punctata* New., mais yeux plus saillants, forme plus élancée, etc.

Synchroa malaccana v. nov. semirufa. Nigropiceus, thorace elytrisque lateraliter late rufescentibus. Perak.

Synchroa submetallica n. sp. Angustatus, nitidus, pubescens, minute punctatus, nigro-piceus, iridescens, capite antice, antennis pedibusque testaceis, elytris substriatis. Long. 9 mill. Iles Andaman. — Très distinct du précédent par les élytres un peu striés, à reflets irisés et le prothorax à peine impressionné à la base.

Callidircæa trinotatus n. sp. Angustatus, nitidus, sericeus, niger, antennis, palpis pedibusque pro majore parte testaceis, elytris nigris, luteo trinotatis. Long. 7 mill. Brésil. — Espèce très distincte par ses élytres ornés d'une petite macule basale, d'une fascie médiane oblique et d'une fascie postmédiane transversale, celles-ci jaunes.

Cette espèce peut rentrer dans un sous-genre nouveau, *Cuphosopalpus*, qui serait distinct par le dernier article des palpes relativement court, non nettement cultriforme, le prothorax moins transversal, les élytres un peu déhiscents au sommet avec la suture nettement relevée et crénelée à l'extrémité.

Serropalpolycus n. gen. Antennis, elongatis depressis ; capite prominulo ; palpis pilosis, articulo ultimo satis breve, subovato ; thorace valido ; elytris subcostatis ; pedibus anticis in mare validis, tarsis latis. — Genre voisin de *Eudircæa* Chp. et paraissant s'en distinguer par les antennes plus aplaties, les palpes plus longs, à dernier article non cultriforme, par le premier article des tarses postérieurs long chez ♂ et ♀, etc.

Serropalpolycus diversipes n. sp. Elongatus, parallelus, fere opacus, niger, capite thoraceque testaceis et nigro maculatis, coxis aliquot femoribus anticis testaceis, elytris ad humeros breve rufo maculatis. Long. 10-12 mill.

Guyane Française. — Jolie espèce, très distincte par sa structure jointe à sa coloration.

Phlœotrya caracasensis (Chevr.) n. sp. Elongatus, opacus, densissime punctatus et pubescens, rufo-brunneus, antennis pedibusque testaceis ; elytris instriatis. Long. 14-16 mill. Vénezuela. — Paraît se distinguer à première vue, de *P. mexicana* Chp. par la base des élytres munie d'une petite carène transversale.

Phlœotrya foveicollis n. sp. Elongatus, parum nitidus, dense punctatus et pubescens, rufescens. Thorace postice ante scutellum late et profunde foveolato ; elytris instriatis. Long. 19 mill. Java. — Très distinct du précédent par la présence d'une fossette sur le milieu de la base du prothorax.

Physcius pallidipes n. sp. Angustatus, albo pubescens, nitidus, niger, antennis ad basin, palpis pedibusque pallido-testaceis. Long. 3 mill. Brésil : S. Paulo. — Voisin de *P. longipennis* Pic, plus étroit avec les pattes plus claires.

Physiomorphus n. gen. Antennis validis et robustis, 11 articulatis, articulo 3° elongato, sequentibus plus minusve latis ; articulo ultimo palparum subsecuriforme ; thorace lateraliter incarinato, breve, postice sinuato, in disco impresso ; pedibus validis. — Ressemble à *Physcius* Champ., yeux moins saillants, antennes et pattes plus robustes, prothorax différent, etc.

Physiomorphus atricolor n. sp. Satis elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger. Thorace subquadrato, in disco quadri impresso, sat dense punctato ; scutello valido ; elytris satis elongatis, instriatis, minute sat dense punctatis ; pygidio prominulo. Long. 5 mill. Guyane Française : Koura.

Falsoconopalpus n. gen. Capite lato, collo breve munito, antennis satis robustis, subfiliformibus, 11 articulatis, articulis 2° et 3° brevissimis ; articulo ultimo palparum

elongato, subcultriforme ; thorace lateraliter parum carinato. postice sinuato ; pedibus satis gracilibus. — Ressemble à *Conopalpus* Gylh., mais prothorax moins large par rapport aux élytres et à arête latérale peu distincte ; antennes bien différentes, de 11 articles avec les 3e et 4e très courts, le 3e surtout.

Falsoconopalpus obscurus n. sp. Oblongus, nitidus, luteo aut griseo pubescens, nigri-piceus, pedibus et articulo ultimo antennarum testaceis. Aliquot thorace elytrisque rufescentibus, capite rufescente aut brunnescente (var. **rufescens**). Capite fortiter et dense punctato, oculis magnis, satis approximatis ; antennis pilosis, longis ; thorace breve, antice modice attenuato, postice minute impresso, paulum fortiter sat sparse punctato ; elytris subconvexis, apice minute attenuatis, fortiter sat sparse punctatis. Long. 3, 5-4 mill. Brésil : Jatahy.

Brasilium n. gen. Capite lato, collo breve, minuto, antennis filiformibus, 11 articulatis, articulo 3o elongato ; articulo ultimo palparum elongato, subcultriforme ; thorace lateraliter sat fortiter carinato, postice sinuato ; pedibus satis gracilibus. — Voisin du genre précédent, mais 2e et 3e articles des antennes plus longs, prothorax à rebord latéral assez tranchant, moins marqué en avant, etc. Diffère, en outre, très nettement de *Conopalpus* Gylh. par la structure des antennes et par la tête plus large derrière les yeux avec le cou qui est court mais apparent.

Brasilium Gounellei n. sp. Oblongus, satis latus, nitidus, longe griseo pubescens, rufo-brunnescens, antennis pro parte pedibusque pallidioribus, elytris rufescentibus, post scutello et lateraliter pro parte piceo tinctis. Thorace breve, in disco sulcato et lateraliter oblique, et fortiter impresso, punctato-granuloso ; elytris satis latis, antice subdepressis, fortiter sat sparse punctatis. Long. 5 mill. Brésil : Nova Friburgo (ex Gounelle).

Brasilium atrofasciatum n. sp. Oblongus, satis

latus, nitidus, griseo pubescens, rufus, antennis pro parte oculisque nigris ; elytris rufis, ad basin et ad medium transverse nigro fasciatis, sutura antice nigra. Long 5 mill. Brésil. — Diffère du précédent, en outre de la coloration, par le prothorax simplement impressionné postérieurement et par la pubescence moins longue.

Brasilium atricorne n. sp. Oblongus, nitidus, griseo pubescens, niger, elytris brunnescentibus. Long. 4 mill. Brésil : Tijuca (ex Gounelle). — Très distinct des précédents par la coloration foncée des membres et la forme plus convexe des élytres qui, en outre, offrent un faible reflet métallique.

Mictopsis longicornis n. sp. Robustus, nitidus, glaber, fusco-æneus, epipleuris, pedibus pro parte antennisque rufescentibus, striis elytrorum purpureo tinctis. Antennis corpore longioribus ; thorace lævе, ad basin transverse punctato, aliquot in disco biimpresso (var. **impressicollis**) ; elytris minute striato-punctatis. Long. 12-13 mill. Madagascar. — Diffère, à première vue, de *M. laticollis* Frm. par les antennes plus longues, dépassant les élytres d'au moins un article et par le prothorax concolore.

Nesogenomorpha n. gen. Oblongo-elongatus, capite post oculos indistincte attenuato et elongato, oculis mediocris, distantibus ; antennis brevibus, articulis intermediis parum dilatatis, apice attenuatis, articulo 3° longiore ; elytris thorace latioribus, apice attenuatis ; pedibus satis validis, pilosis, tarsis ultimis lamellatis, unguiculis pectinatis. — Ce nouveau genre, rentrant dans les *Alleculidæ* mais à faciès de *Nesogena* Mâkl. allongé, se distingue, à première vue, de *Idatius* Frm. par les yeux éloignés du bord antérieur du prothorax et par les antennes différentes, a 3e article bien plus long que le 4e.

Nesogenomorpha semiviolacea n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, nigro-viridescens, elytris cæruleo-violaceis, antennis pedibusque nigris, pro parte brunnescenti-

bus. Capite elongato ; thorace breve, antice valde attenuato, sat fortiter et sparse punctato ; elytris satis latis, apice attenuatis, subconvexis, striatis, intervallis multi punctatis. Long. 22 mill. Madagascar : Diego Suarez.

Pseudocistela (1) **Vuilleti** n. sp. Oblongus, subopacus, distincte pubescens, rufus, thorace nigro trilineato, elytris lateraliter et ad medium nigro bilineatis. Long. 5 mill. Madagascar : Mahatsinjo. — Dédié à la mémoire de A. Vuillet, mort au Champ d'honneur. Très voisin de *P. subvittata* Frm., distinct, à première vue, par la suture non foncée et le prothorax à ligne médiane noire.

Pseudocistela Chatanayi n. sp. Oblongo-ellipticus, parum pubescens, nitidus, pallido-testaceus, oculis, thorace lateraliter et vittis tribus elytrorum nigris. Long. 4,5 mill. Mahatsinjo. — Dédié à la mémoire de J. Chatanay, mort au Champ d'honneur. Très voisin de *P. fuscostrigata* Frm., dessins noirs des élytres analogues mais prothorax bordé de noir sur les côtés.

Pseudocistela vohemarensis n. sp. Oblongo-ellipticus, satis pubescens, nitidus, flavo-testaceus, oculis, thorace lateraliter minute abdomineque apice nigris. Long. 5 mill. Madagascar : Vohemar. — Voisin du précédent, mais plus pubescent et élytres concolores.

Psilonycha usambarana n. sp. Oblongo-ovatus, pubescens, parum nitidus, rufus, oculis, scutello, tibiis aliquot, abdomineque pro parte nigris, thorace elytrisque tenue nigro marginatis. Long. 9-10 mill. Afrique : Usambara. — Ressemble à *P. biimpressa* Pic, mais prothorax non impressionné sur le disque, élytres bordés de foncé et plus nettement striés, etc. Distinct, en outre, de *P. tenella* Fahr. par les élytres bordés de foncé.

Isomira brunneosuturalis. Oblongo-ellipticus, sa-

(1) Genre actuellement composé d'éléments disparates que j'ai l'intention de distinguer plus tard.

tis pubescens, parum nitidus, rufus, pedibus pallidioribus, elytris ad suturam late et lateraliter breve brunneo notatis. Long. 9 mill. Indes : Khasia Hills. — Plus allongé que le précédent et distinct, en outre, par la suture largement rembrunie et la structure tarsale.

Isomira formosana n. sp. Oblongo-ovatus, griseo pubescens, dense ruguloso-punctatus, nitidus, nigro-piceus, capite antice, antennis ad basin pedibusque testaceis. Capite breve ; articulis 3° et 4° antennarum elongatis ; thorace antice subarcuato ; elytris satis brevibus, apice attenuatis, in disco substriatis. Long. 5,5 mill. Formose. — Diffère de *C. oculata* Mars., en outre de la coloration plus foncée, par la forme moins allongée, les yeux touchant le prothorax, etc.

Isomira discithorax n. sp. Oblongo-ovatus, griseo pubescens, plus minusve dense punctatus, nitidus, testaceus, oculis, thorace in disco late, scutello elytrisque ad suturam piceo notatis. Long. 10-10,5 mill. Indes : Darjeeling. — Très voisin du précédent, coloration différente, élytres un peu plus allongés, 3e article des antennes plus court chez ♂, etc.

Xylotrechus unicarinatus n. sp. Satis robustus, postice paulo attenuatus, fere opacus, niger, capite antice, pro parte luteo notato, antennis ad basin, elytris ad basin et lateraliter pedibusque testaceis. Capite unicarinato, carina pro parte sulcata ; thorace subgloboso, in disco carinato, granuloso punctato, ante et ad medium basinque luteo maculato aut fasciato ; elytris antice luteo maculatis et luteo 4-fasciatis, fasciis 2 primis obliquis (secunda ad suturam dilatata), posticis 2 fere rectis ; infra corpore pro parte maculis aut fasciis luteis ornato. Long. 18 mill. Tonkin : Chapa (ex Vitalis). — Cette jolie espèce, qui se rapproche de *X. carinicollis* Jord. pas la carène médiane du prothorax et celle unique et en partie sillonnée de la tête, en est très distincte par un revêtement spécial.

TABLE

POUR LE VINGT-DEUXIÈME FASCICULE

Pages.

Introduction 1

Descriptions abrégées diverses 2